

II. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

Vác, 1993. ápr. 4-7.

12. osztály

1. feladat: Mely n értékre igaz a következő állítás: Bármely n oldalú, önmagát nem metsző sokszögnek van olyan belső pontja, amelyből kerületének minden pontja látszik. (Ha A a sokszög kerületének egy pontja, P pedig a sokszög belső pontja, az A pont akkor látszik P -ből, ha az AP szakasz minden pontja, az A pont kivételével, a sokszög belsejében van.)

Bogdán Zoltán (Cegléd)

2. feladat: A K kocka élhossza 6 egység. Vágjuk szét a K kockát 216 egységkockára. Hány olyan kocka létezik K -ban, amelyet az egységkockák töltenek ki? (Két kockát különbözőnek tekintünk, ha K -n belül különböző helyet foglalnak el.)

Délvidék ()

3. feladat: Határozzuk meg a $\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{1 - \sin \alpha \sin \beta}$ kifejezés maximumát és minimumát, ha α és β tetszőleges valós szögmérték.

Mészáros József (Galánta)

4. feladat: Oldjuk meg a valós számok halmazán a következő egyenletet:

$$(x^2 + 3x - 4)^3 + (2x^2 - 5x + 3)^3 = (3x^2 - 2x - 1)^3.$$

Mészáros József (Galánta)

5. feladat: Határozzuk meg azt a valós együtthatós $P(x)$ polinomot, amely eleget tesz a következő két feltételnek:

$$a) \ xP(x) = (x - 3)P(x + 1) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad b) \ P(4) = -12.$$

Szabó Magda (Szabadka)

6. feladat: Igazoljuk, hogy ha

$$a_i \in \mathbb{R}^+, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (n \in \mathbb{N}^+) \quad \text{és} \quad k \in \mathbb{N}^+ \setminus \{1\},$$

akkor

$$\sqrt[k]{a_1 + a_2 + \dots + a_n} + \sqrt[k]{a_2 + a_3 + \dots + a_n} + \sqrt[k]{a_{n-1} + a_n} + \sqrt[k]{a_n} \geq \sqrt[k]{a_1 + 2^k a_2 + \dots + n^k a_n}.$$

Bencze Mihály (Brassó)