

## 26. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

Somorja, 2017. március 23-27.

### 10. osztály

**1. feladat:** Adott a síkon 2017 (különböző) pont úgy, hogy bármely 3 közül kiválasztható 2, melyek távolsága 1-nél kisebb. Bizonyítsátok be, hogy a 2017 pont között található 1009 olyan, amelyek egységsugarú körben lesznek.


Mészáros József (Jóka)

**Megoldás:** Legyenek  $A$  és  $B$  a 2017 pont közül a legtávolabb elhelyezkedő pontok és írjunk körjüket  $k(A; 1)$  és  $l(B; 1)$  köröket. Legyen  $C$  egy tetszőleges pontja az adott ponthalmaznak. A  $C$  pont  $k(A; 1)$ -be vagy  $l(B; 1)$ -be fog tartozni (ellenkező esetben a feladat feltétele nem teljesülne). Következésképpen a 2017 pont közül legalább 1009 e körök valamelyikébe fog tartozni.

**2. feladat:** Egy derékszögű trapéz egyik alapja 5 cm, a másik alap és a derékszögű szár összege 10 cm. Mekkora lehet a trapéz területének legnagyobb értéke? Mekkora lehet a trapéz kerületének legkisebb értéke?

Dr. Katz Sándor (Bonyhád)

**Megoldás:** Ha a másik alap  $x$ , akkor a derékszögű szár  $10 - x$ . Így a terület  $t = 0,5 \cdot (5 + x) \cdot (10 - x) = 0,5 \cdot (50 + 5x - x^2) = \frac{225}{8} - \frac{1}{2} \cdot \left(x - \frac{5}{2}\right)^2$ .



Ennek a maximuma  $\frac{225}{8} = 28,125 \text{ cm}^2$ . Fejezzük ki a trapéz nem derékszögű  $b$  szárát:  
 $b^2 = (10 - x)^2 + (5 - x)^2 = 2x^2 - 30x + 125 = 2 \left(x - \frac{15}{2}\right)^2 + 12,5$ . A trapéz kerülete  $k = 15 + b$ .  
Ez  $x = \frac{15}{2}$ -nél minimális és ekkor  $k_{min} = 15 + \sqrt{12,5} = 18,54 \text{ cm}$ .

**3. feladat:** Oldjátok meg a következő egyenletet a valós számok halmazán:

$$\frac{6}{\sqrt{x-2017}-9} + \frac{1}{\sqrt{x-2017}-4} + \frac{7}{\sqrt{x-2017}+4} + \frac{12}{\sqrt{x-2017}+9} = 0.$$

Nemecskó István (Budapest)

**Megoldás:** Természetesen  $x \geq 2017$  és vezessük be a  $\sqrt{x-2017} = a$  jelölést. Ekkor  $a \geq 0$ ,  $a \neq 4$ ,  $a \neq 9$ , és  $\frac{6}{a-9} + \frac{1}{a-4} + \frac{7}{a+4} + \frac{12}{a+9} = 0$ .

Innen:

$$\begin{aligned}
 6(a+9)(a^2-16) + (a+4)(a^2-81) + 7(a-4)(a^2-81) + 12(a-9)(a^2-16) &= 0 \\
 (a^2-16)(6a+54+12a-108) + (a^2-81)(a+4+7a-28) &= 0 \\
 (a^2-16)(18a-54) + (a^2-81)(8a-24) &= 0 \\
 18(a^2-16)(a-3) + 8(a^2-81)(a-3) &= 0 \\
 (a-3)(18a^2-18\cdot 16+8a^2-8\cdot 81) &= 0 \\
 (a-3)(26a^2-936) &= 0 \\
 26(a-3)\cdot (a^2-36) &= 0.
 \end{aligned}$$

Ebból  $a = 3$  vagy  $a = 6$  (mivel  $a \geq 0$ ). Ha  $a = 3$ , akkor  $x = 2026$ . Ha  $a = 6$ , akkor  $x = 2053$ . A valós számok halmazán tehát **két megoldás van**:  $x = 2026$  és  $x = 2053$ .

**4. feladat:** Van-e 1000 olyan egymást követő egész szám, melyek között pontosan 5 prímszám van?

*Róka Sándor (Nyíregyháza)*

**Megoldás:** Először is van 1000 olyan egymást követő egész szám, melyek között **nincs** prímszám, nevezetesen pld. ezek:  $1001! + 2, 1001! + 3, 1001! + 4, \dots, 1001! + 1001$ .


„Léptessük” a megadott 1000 számot tartalmazó blokkot 1-gyel lefele, azaz mindegyik szám helyett 1-gyel kisebbet veszünk. **Ilyen léptetésnél a blokkban levő prímek száma maximum 1-gyel változhat**, mert egy számot elhagyunk és beveszünk helyette egy másik számot. Vegyük észre, hogy az első 1000 pozitív egész szám között **több, mint 5** prímszám van.

Tehát lefele lépkedve van olyan blokk, amelyben **pontosan 5** prímszám van.

**5. feladat:** Az  $ABC$  háromszögben  $\angle CAB = 40^\circ$  és  $\angle CBA = 80^\circ$ , a háromszög körülírt körének középpontja az  $O$  pont.  $\angle CBA$  szögfelezője a  $D$  pontban metszi az  $AC$  oldalt. Bizonyítsátok be, hogy a  $DOB$  háromszög körülírt körének középpontja az  $ABC$  háromszög  $C$  pontból induló magasságvonalára illeszkedik!

*Bíró Bálint (Eger)*

**Megoldás:** A feltételeknek megfelelő ábrát készítünk:



Az  $ABC$  háromszög belső szögeinek összege  $180^\circ$ , ezért  $\sphericalangle ACB = 60^\circ$ . Ez azt is jelenti, hogy az  $ABC$  háromszög hegyesszögű háromszög, ezért az ábrán  $k_O$ -val jelölt körülírt körének  $O$  középpontja a háromszög belső pontja, a  $C$  pontból induló magasságvonal  $E$ -vel jelölt talppontja pedig az  $AB$  szakasz belső pontja.

A  $BD$  egyenes felezi a  $\sphericalangle CBA$ -et, így  $\sphericalangle DBA = 40^\circ$ , ebből rögtön következik, hogy a  $DAB$  háromszög egyenlő szárú háromszög, tehát  $DA = DB$ .

Eszerint az  $AB$  szakasz  $OF$  felezőmerőlegesére illeszkedik a  $D$  pont, mégpedig úgy, hogy az  $O$  pont a  $DF$  szakasz belső pontja, hiszen ellenkező esetben a  $k_O$  kör  $O$  középpontja az  $ABC$  háromszög külső pontja lenne.

A  $DO$  szakasz felezőpontját  $G$ -vel jelöltük, a  $DOB$  háromszög körülírt körének középpontja illeszkedik a  $DO$  szakasz felezőmerőlegesére, ez az egyenes az  $ABC$  háromszög  $C$  pontból induló magasságvonalát az  $M$  pontban metszi. A feladat megoldásához elegendő bizonyítani, hogy az  $M$  pont a  $DOB$  háromszög körülírt körének középpontja.


Ehhez először kiszámítjuk a  $DOB$  háromszög szögeit.

A középponti és kerületi szögek összefüggése szerint az  $AOB$  egyenlőszárú háromszögben  $\sphericalangle AOB = 120^\circ$ , ezért  $\sphericalangle FOB = 60^\circ$ , ebből pedig  $\sphericalangle DOB = 120^\circ$  adódik. A  $DFB$  derékszögű háromszögben pedig  $\sphericalangle DBF = 40^\circ$ , és így  $\sphericalangle FDB = \sphericalangle ODB = 50^\circ$ . A  $DOB$  háromszög két szöge tehát  $\sphericalangle DOB = 120^\circ$  és  $\sphericalangle ODB = 50^\circ$ , ezzel azt kapjuk, hogy  $\sphericalangle DBO = 10^\circ$ .

Ugyancsak a középponti és kerületi szögek összefüggése miatt az  $AOC$  egyenlőszárú háromszögben  $\sphericalangle AOC = 160^\circ$ , így  $\sphericalangle ACO = \sphericalangle DCO = 10^\circ$ .

Azt kaptuk tehát, hogy az  $OD$  egyenes ugyanazon oldalán fekvő  $C$  és  $B$  pontokból az  $OD$  szakasz egyaránt  $10^\circ$ -os szögben látszik, hiszen  $\sphericalangle DBO = \sphericalangle DCO = 10^\circ$ , ez pedig azt jelenti, hogy a  $DOB$  háromszög körülírt körére illeszkedik a  $C$  pont.

Ezután megrajzoljuk a  $DOB$  háromszög  $k_M$ -mel jelölt körülírt körét, amelynek az  $AB$  oldallal való második metszéspontját az alábbi ábrán  $H$ -val jelöltük.



Az  $ABC$  háromszög körülírt körében a középponti és kerületi szögek összefüggéséből adódik, hogy  $\sphericalangle BOC = 80^\circ$ , eszerint a  $BC$  szakasz az  $O$  pontból  $80^\circ$ -os szögben látszik.

$ABC$  szakasz a  $DOB$  háromszög körülírt körének húrja, hiszen a  $C$  pont a fentiek szerint illeszkedik a  $k_M$  körre, ezért ez a húr a kerületi szögek tétele miatt a kör  $H$  pontjából ugyan-

csak  $80^\circ$ -os szögben látszik. Eszerint a  $CBH$  háromszög egyenlőszárú háromszög, amelynek  $HB$  alapját a  $CE$  egyenes merőlegesen felezi.


Mivel pedig a  $DOB$  háromszög  $k_M$  körülírt körében  $OD$  és  $HB$  húrok, amelyek felezőmerőlegesei rendre a  $GM$  és  $EM$  egyenesek, ezek  $M$  metszéspontja tehát a  $DOB$  háromszög körülírt körének középpontja. Ezzel igazoltuk a feladat állítását, amely szerint a  $DOB$  háromszög körülírt körének középpontja éppen az  $M$  pont, ez pedig illeszkedik az  $ABC$  háromszög  $C$  pontból induló magasságvonalára

**6. feladat:** A valós számok halmazán oldjátok meg az  $x^4 + 3x^3 + px^2 + 3x + 1 = 0$  egyenletet  $p = 3,25$  esetén! A  $p$  paraméter mely értékei esetén lesz az  $x^4 + 3x^3 + px^2 + 3x + 1 = 0$  egyenletnek négy különböző valós gyöke?

*Dr. Katz Sándor (Bonyhád)*

**Megoldás:** Az egyenlet reciprok, tehát  $x^2$ -tel osztva és  $y = x + \frac{1}{x}$ -et helyettesítve kapjuk az  $y^2 + 3y + p - 2 = 0$  egyenletet. Ennek  $p = 3,25$  esetén két gyöke van:  $y = -2,5$  és  $y = -0,5$ . Csak az előbbihez tartozik  $x$  (mivel  $x + \frac{1}{x} \geq 2$ ), mégpedig  $x = -2$  és  $x = -0,5$ , tehát  $p = 3,25$  esetén az egyenletnek ez a **két valós megoldása van**:  $x = -2$  és  $x = -0,5$ .

Mivel az  $y = x + \frac{1}{x}$  egyenletnek csak  $|y| > 2$  esetén lesz két különböző megoldása, ezért az  $y^2 + 3y + p - 2 = 0$  egyenletnek két kettőnél nagyobb abszolút értékű gyöke kell legyen.



$f(y) = y^2 + 3y + p - 2 = (y + 1,5)^2 + p - 4,25$ , ezért a parabola csúcspontjának első koordinátája  $-1,5$  és ezért két  $2$ -nél nagyobb vagy két  $-2$ -nél kisebb gyök nem lehet.

Csak úgy kaphatunk két, az  $|y| > 2$  feltételnek megfelelő gyököt, ha az egyik gyök  $-2$ -nél kisebb, a másik  $2$ -nél nagyobb. Ennek szükséges és elegendő feltétele, hogy  $f(-2) = 4 - 6 + p - 2 < 0$  és  $f(2) = 4 + 6 + p - 2 < 0$ . Mindkét feltétel  $p < -8$  esetén teljesül.